

Use el aerosol nasal NARCAN® (clorhidrato de naloxona) para una sobredosis de opioides conocida o sospechada en adultos y niños.
Importante: Para uso en la nariz únicamente. No retire ni pruebe el aerosol nasal NARCAN® hasta que esté listo para usar.

1 Identifique la sobredosis de opioides y monitoree una respuesta

Pregunte a la persona si está bien y díglele su nombre. Agite los hombros y frote con firmeza la mitad del pecho. **Verifique si hay signos de sobredosis de opioides:**

- No se despierta ni responde a su voz o tacto
- La respiración es muy lenta, irregular o se ha detenido
- La parte central del ojo es muy pequeña, a veces llamada "pupilas puntiformes"

Coloque a la persona boca arriba para recibir una dosis del aerosol nasal NARCAN®.



2 Aplique el aerosol nasal NARCAN®

RETIRE el aerosol nasal NARCAN® de la caja. Retire la pestaña con el círculo para abrir el aerosol nasal NARCAN®. **Sostenga** el aerosol nasal NARCAN® con el pulgar en la parte inferior del émbolo rojo y el primer dedo y el medio a cada lado de la boquilla.



Inserte suavemente la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales.

- Incline la cabeza de la persona hacia atrás y brinde apoyo con la mano debajo del cuello. Inserte suavemente la punta de la boquilla en **una fosa nasal** hasta que los dedos de ambos lados de la boquilla estén contra la parte inferior de la nariz de la persona. **Presione firmemente el émbolo rojo** para administrar la dosis del aerosol nasal NARCAN®.
- Retire el aerosol nasal NARCAN® de la fosa nasal después de administrar la dosis.

3 Llame para obtener ayuda médica de emergencia, evalúe y apoye

Solicite ayuda médica de emergencia de inmediato. Ponga a la persona de costado (posición de recuperación) después de administrar el aerosol nasal NARCAN®.

Monitoree a la persona de cerca. Si la persona no responde despertándose, con la voz o el tacto, o comienza a respirar normalmente, se puede administrar otra dosis. El aerosol nasal NARCAN® se puede administrar cada 2 a 3 minutos, si está disponible. **Repita el Paso 2 usando un nuevo aerosol nasal NARCAN® para administrar otra dosis en otra fosa nasal.** Si se dispone de aerosoles nasales NARCAN® adicionales, repita el paso 2 cada 2 a 3 minutos hasta que la persona responda o reciba ayuda médica de emergencia.



INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

El aerosol nasal NARCAN® es un medicamento recetado que se usa para el tratamiento de una emergencia conocida o sospechada de sobredosis de opioides con signos de problemas respiratorios y somnolencia grave o que no puede responder.

El aerosol nasal NARCAN® debe administrarse de inmediato y no reemplaza la atención médica de emergencia. Solicite ayuda médica de emergencia inmediatamente después de administrar la primera dosis del aerosol nasal NARCAN®, incluso si la persona se despierta.

El aerosol nasal NARCAN® es seguro y eficaz en niños para sobredosis de opioides conocida o presunta.

No use el aerosol nasal NARCAN® si es alérgico al clorhidrato de naloxona o a cualquiera de los ingredientes del aerosol nasal NARCAN®.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre el aerosol nasal NARCAN®? El aerosol nasal NARCAN® se usa para revertir temporalmente los efectos de los medicamentos opioides. El medicamento en el aerosol nasal NARCAN® no tiene ningún efecto en las personas que no están tomando medicamentos opioides. Siempre lleve consigo el aerosol nasal NARCAN® en caso de sobredosis de opioides.

Use el aerosol nasal NARCAN® de inmediato si usted o su cuidador piensan que hay signos o síntomas de sobredosis de opioides, incluso si no está seguro, porque una sobredosis de opioides puede causar lesiones graves o la muerte.

Los signos y síntomas de una sobredosis de opioides pueden incluir somnolencia inusual e incapacidad para despertar a la persona con voz alta o frotando firmemente en la mitad del pecho (esternón); problemas respiratorios, que incluyen respiración lenta o superficial en una persona difícil de despertar o que parece que no está respirando; el círculo negro en el centro de la parte de color del ojo (pupila) es muy pequeño, a veces se denomina "pupila puntiforme" en alguien que no despierta.

Los familiares, cuidadores u otras personas que posiblemente deban usar el aerosol nasal NARCAN® en una emergencia con opioides deben saber dónde se almacena el aerosol nasal NARCAN® y cómo administrar NARCAN® antes de una emergencia con opioides.

Solicite ayuda médica de emergencia inmediatamente después de administrar la primera dosis del aerosol nasal NARCAN®. Se puede administrar respiración de rescate o RCP (reanimación cardiopulmonar) mientras se espera la ayuda médica de emergencia.

Los signos y síntomas de una sobredosis de opioides pueden regresar después de administrar NARCAN®

Se administra aerosol nasal. Si esto sucede, administre otra dosis después de 2 a 3 minutos utilizando un nuevo aerosol nasal NARCAN® y monitoree a la persona atentamente hasta recibir ayuda de emergencia.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de usar el aerosol nasal NARCAN®?

Antes de usar el aerosol nasal NARCAN®, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si: tiene problemas cardíacos; está embarazada o planea quedar embarazada. El uso del aerosol nasal NARCAN® puede causar síntomas de abstinencia en su bebé en gestación. Un proveedor de atención médica debe examinar a su bebé en gestación inmediatamente después de que use el aerosol nasal NARCAN®, esté amamantando o planea amamantar. Se desconoce si el aerosol nasal NARCAN® pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las drogas, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del aerosol nasal NARCAN®?

El aerosol nasal NARCAN® puede causar efectos secundarios graves, que incluyen síntomas repentinos de abstinencia de opioides que pueden ser graves. En alguien que ha estado usando opioides con regularidad, los síntomas de abstinencia de opioides pueden presentarse repentinamente después de recibir el aerosol nasal NARCAN® y pueden incluir: dolores corporales, diarrea, aumento de la frecuencia cardíaca, fiebre, secreción nasal, estornudos, escalofríos, sudoración, bostezos, náuseas o vómito, nerviosismo, inquietud o irritabilidad, estremecimientos o temblores, dolor estomacal, debilidad, aumento de la presión arterial.

Algunos pacientes pueden mostrar un comportamiento agresivo al revertir abruptamente una sobredosis de opioides.

En bebés menores de 4 semanas que han estado recibiendo opioides con regularidad, la abstinencia repentina de opioides puede ser potencialmente mortal si no se trata de la forma correcta. Los signos y síntomas incluyen: convulsiones, llanto más de lo habitual y aumento de los reflejos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios del aerosol nasal NARCAN®. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

NNS CON ISI 08/2020

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA